

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:  
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



## Les racines rachidiennes

### Introduction :


La moelle épinière communique avec la périphérie par **31 paires de nerfs rachidiens** : 8 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrales, 1 coccygienne

Le nerf rachidien naît de la réunion de deux racines au niveau du **trou de conjugaison** : une **racine postérieure** (dorsale) et une **racine antérieure** (ventrale)

### Dualité fonctionnelle des racines rachidiennes antérieure et postérieure :

#### 1. Expériences de section et de stimulation : (expériences de Bell et Magendie)

Chez un animal spinal, après avoir sectionné des racines rachidiennes, on procède à des stimulations et on observe les résultats.



### EXPERIENCES DE BELL ET MAGENDIE


	Racine antérieure	Racine postérieure
Stimulation du bout périphérique	contraction	Pas de contraction
Stimulation du bout central	Pas de contraction	contraction


Conclusion :

- La racine **antérieure** est **efférente** (médullofuge) et **motrice**
- La racine **postérieure** est **afférente** (médullopète) et **sensitive**

#### 2. Etudes des dégénérescences Wallériennes :

Tout prolongement nerveux séparé de son corps cellulaire dégénère. Il reste vivant dans le cas Contraire






*Etude des dégénérescences wallériennes après section du nerf de conjugaison (I) de la racine antérieure (II), de la racine postérieure (III et IV). Les zones qui dégèrent sont hachurées.*

#### Conclusion :

- Les corps cellulaires des **racines postérieures** se trouve dans le ganglion spinal
- Les corps cellulaires des **racines antérieures** se trouve dans la moelle

#### 3. Exception apparente : Le cas de la sensibilité récurrente

Elle résulte d'une disposition anatomique particulière qui assure la sensibilité des racines ventrales. En 1822, Magendie avait constaté que le pincement de la racine ventrale provoque des réactions douloureuses. Les faits expérimentaux suivants confirment cela :



La stimulation de la racine ventrale suite à la section du nerf ou de la racine dorsale n'entraîne pas de Douleur

*Innervation radiculaire = innervation directe des branches du plexus.*

*Innervation tronculaire = innervation par un nerf*



### Caractère métamérique de l'innervation radiculaire :

Chaque racine innerve un territoire corporel précis appelé **métamère**. Elle comprend 2 aspects :

#### Innervation radiculaire sensitive :

Chaque racine sensitive correspond à un territoire cutané en bande appelé **dermatome**



#### Mise en évidence :

- **Méthode de la sensibilité persistante de Sherrington** : on sectionne les 3 racines postérieures au-dessus et au-dessous de la zone que l'on veut étudier.
- **Méthode d'hyperesthésie** de la zone d'innervation d'une racine postérieure grâce à la **Strychnine**

#### Strychnine

#### Topographie :

Par des constatations chirurgicales et des déductions anatomo-cliniques il a été constaté que **les dermatomes se chevauchent** et la topographie radiculaire chez l'homme a été établie



R! l'innervation de la face se fait par le nerf trijumeau.

### Application clinique :

Le **Zona** est une maladie infectieuse provoquée par un virus qui **attaque le ganglion rachidien**. Il donne des vésicules et des douleurs dans la zone cutanée innervée par la racine postérieure atteinte.

### Innervation radiculaire motrice :

Chaque racine motrice correspond à une territoire musculaire.

La section d'une seule racine antérieure ne provoque pas de paralysie nette. Ceci car le plus souvent, **un même muscle est innervé par plusieurs racines** et souvent **une même racine envoie des fibres à différents muscles** (même de fonctions très différentes)(exemple : la racine L5 innerve les muscles jambier antérieur et moyen fessier).

L'ensemble des muscles innervés par une racine motrice constitue **un champ radiculaire moteur**

### Application clinique :

**Les radiculopathies** sont des **atteintes des muscles** innervés par les racines lésées.

A l'**électro-neuro-myographe (ENMG)** on observe la présence d'une **dénervation** des muscles lésés.

## Composition des racines rachidiennes

### 1. Racines postérieures :

Au niveau des racines postérieures à la jonction radiculo-médullaire, les fibres afférentes ont une disposition particulière;

- **Les fibres A  $\alpha\beta$**  se positionnent en région **dorso-médiane** (sensibilité tactile épicritique et sensibilité proprioceptive consciente et inconsciente) ; large diamètre (6-20  $\mu$ m) myélinisées de conduction rapide (30-120 m/s) >> **Mécanorécepteurs de bas seuil** cutanés, articulaires, et musculaires.

- **Les fibres A  $\delta$  et C** s'organisent en position **ventro-latérale** (sensibilité douloureuse et sensibilité thermique non douloureuse),

- \*Fibres **A $\delta$** : petits diamètre (1-5  $\mu$ m) myélinisées, vitesse de conduction (4-30 m/s)

- >> **Mécanorécepteurs de haut seuil** (mécanonocicepteurs) cutanés, musculaires, articulaires; Également nocicepteurs polymodaux et nocicepteur pour le froid.

- \*Fibres **C**: petits diamètre (0.3-1.5  $\mu$ m), non myélinisées, de conduction lente (0.4-2 m/s)

- >> **Nocicepteurs polymodaux** cutanés, musculaires (fibres IV), articulaires (fibres IV);

- Mécanonocicepteurs** ; **Thermorécepteurs** cutanés: au chaud et au froid non nocif et Afférences viscérales (type C).

### 2. Racines antérieures :

Les racines antérieures sont formées par :

- Fibres larges (deux tiers) de fibres myéliniques de 8 à 18  $\mu$ m à conduction rapides : muscle strié squelettique (**motoneurone  $\alpha$** )

- Fibres étroites (tiers restant) de fibres myéliniques est composé de fibres de petit calibre (3 à 8  $\mu$ m) à vitesse de conduction lente : -fibres destinées aux FNM (**motoneurone  $\gamma$** )

- fibres végétatives préganglionnaires.

N.B : fibres récurrentes, aberrantes des racines antérieures.